

# Nuclie

MEDICINA NUCLEAR

## CINTILOGRAFIA RENAL PARA PESQUISA DE HIPERTENSÃO RENOVASCULAR

### ORIENTAÇÕES PARA QUE SERVE?

Auxilia na identificação da presença de hipertensão arterial causada pelos rins.

### ORIENTAÇÕES ANTES DO EXAME:

#### Cintilografia Renal Dinâmica

- Mulheres grávidas, com suspeita de gravidez ou amamentando não poderão realizar o exame;
- Caso seja urgente realizar o exame em mulheres que estão amamentando, elas devem interromper o aleitamento no dia do exame e só voltar à prática 2 dias depois;
- É obrigatório jejum de, no mínimo, 4 horas antes do exame;
- O paciente deverá trazer por escrito o nome dos medicamentos que está tomando no momento;
- Será necessário suspender o uso dos seguintes medicamentos alguns dias antes do exame:
  - 2 dias – Captopril, losartana, valsartana e diuréticos;
  - 3 dias – Lisinopril, enalapril e ramipril
  - 5 dias: Irbesartan, candesartan, telmisartan, fosinopril e perindoprilSó suspenda o uso de medicamentos com a autorização do seu médico
- Algumas horas antes do exame beba aproximadamente 3 copos de água ou outro líquido. Será solicitado ao paciente que urine antes de iniciar o exame;
- Caso esteja fazendo tratamento para infecção urinária, o paciente deverá avisar a equipe clínica;
- Se possível, trazer laudos de exames realizados previamente e que sejam de interesse. (cintilografia renal, ultrassonografia, urografia excretora, uretrocistografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, entre outros);
- Utilizar roupas confortáveis e evitar o uso de peças que contenham partes metálicas (botões, fivelas, zíperes) bem como não utilizar pulseiras, brincos ou outras peças, pois podem interferir nas imagens;
- Só serão aceitos acompanhantes (maiores de 18 anos) se o paciente tiver necessidades especiais;

Imperial Hospital de Caridade  
R. Menino Deus, 376 - Centro  
Florianópolis - SC | 88020-210  
(048) 3380.1100 / 99142-2486  
[www.nuclie.com.br](http://www.nuclie.com.br)

# Nuclie

## MEDICINA NUCLEAR

### COMO É REALIZADO O EXAME?

A cintilografia renal para pesquisa de hipertensão renovascular é realizada em 3 etapas, podendo ser repetida em outro dia, conforme orientação médica. Antes de iniciar o exame, o paciente recebe uma dose oral de captopril. Nas horas que seguem, sua pressão arterial será aferida a cada 15 minutos. Em seguida, o paciente terá que ir ao banheiro para esvaziar sua bexiga, em seguida, ele receberá o contraste radioativo pela veia e será acomodado na gama câmara onde fará as imagens dos rins e da bexiga durante, aproximadamente, 40 minutos. Em alguns casos, o procedimento poderá se repetir e o paciente terá que esvaziar a bexiga para captar as imagens novamente. Porém, a duração para esta etapa será de aproximadamente 10 minutos.

### RECOMENDAÇÕES

Não há necessidade de se ausentar do trabalho após o exame. Ressaltamos que os níveis de radiação administrados são mínimos e absolutamente seguros.

Imperial Hospital de Caridade  
R. Menino Deus, 376 - Centro  
Florianópolis - SC | 88020-210  
(048) 3380.1100 / 99142-2486  
[www.nuclie.com.br](http://www.nuclie.com.br)