

CISTERNOCINTILOGRAFIA

ORIENTAÇÕES PARA QUE SERVE?

Este exame é utilizado geralmente para pesquisa de hidrocefalia e fístulas liquóricas. As imagens são adquiridas imediatamente após administração do radiofármaco na região lombar, por equipe médica especializada (anestesiologista).

ORIENTAÇÕES ANTES DO EXAME:

- Mulheres grávidas, com suspeita de gravidez ou amamentando não poderão realizar o exame;
- Não é necessário jejum para o exame;
- Se possível, trazer laudos de exames realizados previamente e que sejam de interesse (cintilografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, biópsias ou relatórios médicos);
- Alguns medicamentos, tais como Marevan, Marcomar, Plavix, Pradaxa, Versa, Clopidogrel, Heparina e AAS deverão ser suspensos por 1 semana antes do exame, somente com a autorização do médico solicitante;
- Não suspender medicamentos em uso de rotina, tais como anti-hipertensivos, remédios para diabetes, insulina, tiroide ou qualquer outro;
- Utilizar roupas confortáveis e evitar o uso de peças que contenham partes metálicas (botões, fivelas, zíperes) bem como não utilizar pulseiras, brincos ou outras peças, pois podem interferir nas imagens;
- Só serão aceitos acompanhantes (maiores de 18 anos) se o paciente tiver necessidades especiais;
- Informar se realizou exames de Medicina Nuclear nos últimos 30 dias para que seja verificada a necessidade de aguardar algum intervalo de tempo antes desta cintilografia;
-

COMO É REALIZADO O EXAME?

Após a avaliação preliminar com o neurologista ou anestesista, o paciente será submetido a uma punção lombar. Uma agulha será introduzida ao canal medular, semelhante ao procedimento de anestesia, para a administração de uma pequena quantidade do material radioativo. Em seguida, será orientado a permanecer

Nuclie

MEDICINA NUCLEAR

deitado, no mínimo, por 30 minutos. Após esse período, o paciente será liberado e orientado a retornar em 2 a 4 horas, quando será encaminhado à sala de exames e imagens do crânio serão adquiridas com duração de 30 a 40 minutos. Após 6 horas da punção, o paciente deverá retornar para a aquisição de outra sequência de imagens. Imagens de 24 horas poderão ser solicitadas, dependendo da análise do médico nuclear.

Obs.: O paciente será orientado a repousar e hidratar-se abundantemente no período de 48 horas a 72 horas após o processo.