

Nuclie

MEDICINA NUCLEAR

ESVAZIAMENTO GÁSTRICO - SÓLIDO/LÍQUIDO

ORIENTAÇÕES

PARA QUE SERVE?

Avalia o esvaziamento gástrico.

ORIENTAÇÕES ANTES DO EXAME:

- Jejum de 4 horas (para pacientes acima de 6 anos) e de 2 horas (pacientes menores que 6 anos);
- Mulheres grávidas, com suspeita de gravidez ou amamentando não poderão realizar o exame;
- Suspender por 24 horas: metoclopramida (Plasil, Plamet), tegaserod, eritromicina, domperidona, meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, glicopirolato;
- Se possível, trazer laudos de exames realizados previamente e que sejam de interesse. (cintilografia, endoscopia ou manometria esofágica);
- Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã durante todo o exame;
- Diabéticos deverão coletar glicemia que deverá estar menor que 200mg/dL. No momento da ingestão da refeição, os diabéticos insulino-dependentes deverão utilizar insulina em dose habitual;
- Utilizar roupas confortáveis e evitar o uso de peças que contenham partes metálicas (botões, fivelas, zíperes) bem como não utilizar pulseiras, brincos ou outras peças, pois podem interferir nas imagens;
- Só serão aceitos acompanhantes (maiores de 18 anos) se o paciente tiver necessidades especiais;

COMO É REALIZADO O EXAME?

Uma breve entrevista com o médico será realizada e o paciente receberá uma dose de radiofármaco em alimento sólido ou líquido. Após a ingestão do alimento sólido, o paciente será posicionado na maca do aparelho e imagens serão adquiridas imediatamente, durante 30 minutos, e após 1, 2 e 3 horas. No caso de ingestão de líquidos, o paciente será conduzido à sala onde o exame serão realizadas imagens sequenciais durante 40 minutos.

Imperial Hospital de Caridade
R. Menino Deus, 376 - Centro
Florianópolis - SC | 88020-210
(048) 3380.1100 / 99142-2486
www.nuclie.com.br